

Termo de Esclarecimento e Consentimento

TUMOR PALPEBRAL

Declaro que desejo submeter-me voluntária e conscientemente à cirurgia para **Remoção de Tumor Palpebral** () Superior () Inferior () Direita () Esquerda, estando ciente dos aspectos que vêm especificados a seguir:

- O objetivo da cirurgia é a retirada por completo da lesão tumoral da pálpebra.
- Após uma cirurgia bem sucedida, o tumor pode recidivar, ou seja, voltar a crescer, independente dos recursos médicos utilizados.
- No período pós-operatório podem ocorrer desconforto, coceira, sensação de repuxamento, edema (inchaço) palpebral, hematoma (coloração arroxeada na pele) e ptose (queda da pálpebra). Tais alterações costumam ser transitórias e geralmente melhoram após a regressão do processo inflamatório, podendo ser perenes em raras circunstâncias.
- Em alguns casos, dependendo do resultado do exame anátomo-patológico, nova cirurgia poderá ser necessária, ampliando-se a área palpebral a ser removida.
- Deformidades nas pálpebras ou na face poderão surgir dependendo da quantidade de tecidos e estruturas removidas, o que pode comprometer a estética facial, bem como o funcionamento adequado de certas estruturas palpebrais e/ou faciais como pele, músculos e nervos.
- O procedimento, como qualquer intervenção cirúrgica, mesmo sem intercorrências, oferece riscos potenciais a si inerentes, ainda que raros, tais como:
 - Processos inflamatórios leves, moderados ou graves na pálpebra.
 - Infecção pós-operatória.
 - Formação de quelóide (cicatriz mais grossa que o normal) dependendo da predisposição de cada paciente.
 - Pigmentação (escurecimento) da cicatriz, o que pode ser mais ou menos evidente, também dependendo da susceptibilidade de cada paciente.
 - Deiscência de sutura, ou seja, os pontos se soltarem antes do tempo previsto, em virtude de infecção, inflamação exagerada, traumas locais ou espontaneamente.

- Sangramento discreto, moderado ou intenso através dos pontos, o que pode necessitar de nova intervenção cirúrgica.
 - Ptose (queda da pálpebra) transitória em virtude do edema (inchaço) inflamatório ou, mais raramente, definitiva, por desinserção dos músculos elevadores das pálpebras superiores.
- Devo, segundo orientação médica, adquirir e fazer uso de toda a medicação prescrita e comparecer a todas as consultas pós-operatórias, além de comunicar imediatamente quaisquer anormalidades que venham a ocorrer após a cirurgia.

Tendo sido esclarecido quanto a tudo que indaguei acerca da cirurgia a ser realizada, declaro que compreendi perfeitamente todas as informações contidas neste termo e autorizo a realização do procedimento.

Belo Horizonte, _____ de _____ de 20_____.

Nome do paciente (ou Responsável)

Assinatura do paciente (ou Responsável)

Assinatura e carimbo do Médico